年　間　予　定　表（平成27年）

予定		実行日	葡萄 作業	葡萄 殺虫用	葡萄 殺菌用	葡萄 注意	メロン	イチゴ	パッションフルーツ	プルーン	ブルーベリー	フェイジョア	キウイ	みかん	レモン	ニンニク	薔薇	その他
1	上旬																	
	中旬			石灰硫黄合剤　15倍		石灰硫黄合剤はﾍﾞﾝﾚｰﾄ水和剤のみ混用可				石灰硫黄合剤40倍				200倍	200倍			
				越冬病害虫	べと病・黒とう病・つる割													
	下旬																	
2	上旬		芽傷入れ（～中旬）・接ぎ木														本剪定	
			発芽促進剤(ｱﾐﾉﾒﾘｯﾄ青・2倍液)															
	中旬															施　肥		
	下旬		発芽促進剤(ｱﾐﾉﾒﾘｯﾄ青・3倍液)															
3	上旬		土壌乾燥注意（～4月中旬）				種蒔	開花・受粉						剪定（～下旬）				
			自家製堆肥							施　肥	施　肥	施　肥	施　肥				施　肥	
	中旬			ｶﾞｯﾄｷﾗｰ乳剤										施　肥	施　肥			アスパラ　苗植
				ブドウトラカミキリ														
				ニンニク唐辛子	ICﾎﾞﾙﾄﾞｰ66D	石灰硫黄合剤とは2週間以上あける												
																	ｵﾙﾄﾗﾝDX顆粒	
	下旬		雨除けビニールシート張り・発芽前（～4月上旬）				ｼﾞﾏﾝﾀﾞｲｾﾝ1000											
4	上旬		発芽時期														施　肥	
				ニンニク唐辛子			定植											トマト　苗植
	中旬		芽欠き取り　展葉2～3枚															
			花穂の発生（～5月中旬）															
	下旬			ニンニク唐辛子	ICﾎﾞﾙﾄﾞｰ66D		ｱｰﾃﾞﾝﾄ水和剤											
					灰色かび病・黒とう病・べと病・うどんこ病													
			誘引　展葉5～10枚（～6月上旬）															
5	上旬		不要花穂の切落し整形（～6月上旬）					収穫		施　肥	施　肥	施　肥					施　肥	
			展葉10～15枚/房先8枚の葉を残して摘心/枝先カット（摘															
	中旬			ニンニク唐辛子	ICﾎﾞﾙﾄﾞｰ66D													
					灰色かび病・黒とう病・べと病・うどんこ病													
			満開～5日ジベレリン25ppm溶液+食紅															
			ネオマスカット満開　ジベレリン処理															
			安芸クイーン・ピオーネ・藤稔満開　ジベレリ															ワケギ堀上
			巨峰満開　ジベレリン処理															
			摘房・摘粒（～6月中旬）															
	下旬			ニンニク唐辛子	ICﾎﾞﾙﾄﾞｰ66D												モスピラ	
					灰色かび病・黒とう病・べと病・うどんこ病													
			施　肥							施　肥	施　肥	施　肥					ﾍﾞﾝﾚｰﾄ水和	
			満開10～15日ジベレリン25ppm溶液+食紅					収穫										
			ネオマスカット　ジベレリン処理														施　肥	
6	上旬			ニンニク唐辛子	ICﾎﾞﾙﾄﾞｰ66D				開花・受粉							収　穫 平戸		
			安芸クイーン・ピオーネ・藤稔・巨峰　ジベレリ								収穫							
				ｱｰﾃﾞﾝﾄ水和剤	ｼﾞﾏﾝﾀﾞｲｾﾝ	ｼﾞﾏﾝﾀﾞｲｾﾝはｱｰﾃﾞﾝﾄ・ｵﾙﾄﾗﾝと混用可												
				ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾐｳﾏ	黒とう病・晩腐病・べと病													
			袋かけ・ネオマスカット															
			施　肥　　有機石灰							施　肥		施　肥		施　肥	施　肥		ｶﾘｸﾞﾘｰﾝ	
	中旬				ICﾎﾞﾙﾄﾞｰ66D				施　肥			開花・受粉						
	下旬		袋かけ 安芸クイーン・ピオーネ・藤稔・巨峰															
7	上旬		袋かけ後		ICﾎﾞﾙﾄﾞｰ66D		収穫		施　肥	施　肥		施　肥					施　肥	
														オルトラン DX顆			オルトラン DX顆	
	中旬		伸長停止期				種蒔	子株取			収穫							
					ICﾎﾞﾙﾄﾞｰ66D													
	下旬		雨除けビニールシート撤去(予定)															
			施　肥　　微量要素液肥葉裏散布															
				ニンニク唐辛子	ICﾎﾞﾙﾄﾞｰ66D													
8	上旬		収穫	施　肥　　微量要素液肥樹元			ｼﾞﾏﾝﾀﾞｲｾﾝ1000		収穫	収穫				ｽﾐﾁｵﾝ乳剤			施　肥	
	中旬			ニンニク唐辛子	ICﾎﾞﾙﾄﾞｰ66D		定植											
				不要枝剪定														
	下旬				ICﾎﾞﾙﾄﾞｰ66D													
				ナイアガラ2本、ネオマスカット1本伐														
				接木用台木植え(ピオーネ)														
9	上旬						ｱｰﾃﾞﾝﾄ水和		施　肥	施　肥	施　肥	施　肥		施　肥	施　肥			
	中旬		礼　肥						開花・受粉									
				ｵﾙﾄﾗﾝ水和剤	ﾍﾞﾝﾚｰﾄ水和剤													
	下旬															植　付		
					ICﾎﾞﾙﾄﾞｰ66D													
			浅耕運															
10	上旬							定植					収　穫				施　肥	牡丹芍薬剪定蕪分け
	中旬		苦土石灰　・　浅耕運														GFｵﾙﾄﾗﾝ	ｸﾛｰﾊﾞｰの種蒔き
	下旬						収　穫					収　穫					ｶﾘｸﾞﾘ	ワケギ植付
11	上旬												施　肥				施　肥	
			落　葉						収　穫									
	中旬			ｶﾞｯﾄｷﾗｰ乳剤														
				ブドウトラカミキリ														
	下旬		施　肥							施　肥	施　肥	施　肥	施　肥				施　肥	
12	上旬								施　肥	剪定		施　肥		収　穫	収　穫		仮剪定	
			仮剪定5芽残し・落葉後（～下旬）**時期厳守**						剪定									
	中旬			石灰硫黄合剤　15倍		石灰硫黄合剤はﾍﾞﾝﾚｰﾄ水和剤のみ混用可				石灰硫黄合剤40倍								
				越冬病害虫	べと病・黒とう病・つる割								剪定					
	下旬																	